



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE  
GERÊNCIA EXECUTIVA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA  
IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NO ESTADO



# RELAÇÃO ESTADUAL DE MEDICAMENTOS



## LISTA DE ANEXOS

**ANEXO 01** - GUIA DE ORIENTAÇÃO AO USUÁRIO DE MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS

**ANEXO 02** - GUIA DE ORIENTAÇÃO AO PORTADOR DE OSTEOPOROSE GRAVE

**ANEXO 03** - GUIA DE ORIENTAÇÃO AO USUÁRIO DE ANÁLOGOS DE INSULINAS

**ANEXO 04** - RESOLUÇÃO CIB-PBNº09,DE3DEFEVEREIRO DE2019

## Entendendo a Relação Estadual de Medicamentos no Estado da Paraíba

A publicação da lista de medicamentos essenciais do Estado se constitui como um instrumento para garantido acesso à assistência farmacêutica e para promoção do uso racional de medicamentos, norteados, sobretudo, em consonância à Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (Rename), uma vez que contempla um elenco de medicamentos necessários ao tratamento e controle da maioria das patologias prevalentes no País.

A REME, em sua magnitude, também cumpre papel estratégico nas políticas de saúde, ao relacionar os medicamentos de distribuição gratuita indicados para atendimento de doenças ou de agravos no âmbito do Sistema Único de Saúde de acordo com as responsabilidades de financiamento da Assistência Farmacêutica entre os entes (União, estados e municípios), proporcionando transparência nas informações sobre o acesso aos medicamentos do SUS.

O acesso universal e igualitário à assistência farmacêutica pressupõe que o usuário esteja assistido por ações e serviços de Saúde do SUS, que o medicamento tenha sido prescrito por profissional de Saúde no exercício regular de suas funções no SUS, e que a prescrição esteja em conformidade com a REME, os Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) ou com relação complementar de medicamentos estabelecida pela gestão estadual, uma vez que podemos atuar nos eventuais vácuos normativos deixados pelo nível nacional.

No tocante ao acesso a medicamentos do Componente Especializado, o Ministério da Saúde (MS) estabeleceu regras diferenciadas para o acesso, o que se concretizou com a pactuação e publicação da Portaria GM/MS nº 2.928, de 12 de dezembro de 2011. O acesso a esses medicamentos está garantido mediante pactuação entre a União, Estados, Distrito Federal e Municípios. A principal característica desse Componente é a garantia da integralidade do tratamento medicamentoso, em âmbito ambulatorial, para todas as condições clínicas contempladas no CEAF, por meio das diferentes linhas de cuidado definidas nos PCDT - Link para acesso: [CONITEC — Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde - CONITEC \(www.gov.br\)](#)

A mencionada Portaria define a classificação dos medicamentos em três grupos distintos, alocados com base na complexidade da doença a ser tratada ambulatorialmente, da garantia de integralidade do tratamento no âmbito da linha de cuidado, e da manutenção do equilíbrio financeiro entre as esferas de gestão. Desta forma os grupos estão relacionados às responsabilidades por seu financiamento.

O 'Grupo 1', financiado pelo MS, é constituído por dois elencos distintos. O 'elenco 1A', com medicamentos cuja compra está sob a responsabilidade do Ministério da Saúde, e o 'elenco 1B', com compra sob responsabilidade das SES. No caso do elenco 1B, os valores financeiros gastos pelas SES são ressarcidos às secretarias, mediante apresentação das APAC, com base nos valores estabelecidos na tabela SIA/SUS.

O 'Grupo 2' é constituído por medicamentos cuja compra e financiamento estão sob a responsabilidade das SES. O 'Grupo 3' traz os medicamentos do CBAF que integram a linha de cuidado do tratamento da doença, estando a compra, o financiamento e a dispensação dos medicamentos sob a responsabilidade das Secretarias Municipais de Saúde.

Com relação às demandas judiciais de âmbito coletivo, existe, atualmente, no Estado da Paraíba, três Ações Civis Públicas, são elas:

1. Diabetes:Garantir o fornecimento de insulina sanálogas de ação prolongada e rápida (respectivamente):  
Glargina e Asparte;

2. Neoplasias (Câncer): Alfatirotropina, Abiraterona, Bevacizumabe, Sorafenibe, Sunitinibe, Rituximabe,  
Tamoxifeno e Temozolomida.

3. Osteoporose: ÁcidoZoledrônico(Aclasta®), Teriparatida(Forteo®), Denosumabe(Prolia®)

Para esses medicamentos, a SES atende administrativamente os usuários. No fluxo atual, o usuário deverá realizar a abertura de um processo administrativo na SES,ou em cada uma das Gerências Regionais de Saúde-GRS e solicitar os formulários para solicitação do medicamento. Para cada grupo de doenças são exigidas algumas documentações para composição do processo.

Vale salientar que há duas excepcionalidades quanto à solicitação de tratamento para o câncer:

- i) Quanto ao usuários que fazem o tratamento pelo Hospital do Bem – Unidade Oncológica do Complexo Hospitalar Regional Deputado Janduhy Carneiro, estes deverão realizar o preenchimento do formulário de solicitação e a juntada de documentação exigida pelo UNACON, ficando a Unidade responsável de encaminhar toda documentação para abertura do processo administrativo ao Setor de Protocolo da SES, situada na capital, para pós envio ao Núcleo de Assistência Farmacêutica para análise;
- ii) O município de João Pessoa, de forma solidária, conforme sentença, deverá ser responsável pelo fornecimento dos antineoplásicos Bevacizumabe, Sorafenibe e Abiraterona aos usuários comprovadamente residentes em João Pessoa.

Porfim, a atualização permanente da REME, como instrumento promotor do uso racional e lista orientadora do financiamento e acesso a medicamentos no âmbito da Assistência Farmacêutica dispensados pelo Estado, perenemente, está posta ainda como grande desafio para a gestão, diante da complexidade das necessidades de saúde da população, da velocidade da incorporação tecnológica, dos diferentes modelos de organização e financiamento do sistema de saúde.

## RELAÇÃO DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS DO ESTADO DA PARAÍBA

Denominação genérica	Concentração/ Composição	Forma farmacêutica	Responsabilidade de aquisição	Responsabilidade de financiamento	Responsabilidade de dispensação ao usuário	Documento norteador
abatacepte	250 mg	pó para solução injetável	1A	MS	SES	PCDT Artrite Reumatoide; PCDT Artrite Idiopática Juvenil
	125mg/mL	Solução injetável	1A	MS	SES	PCDT Artrite Reumatoide
acetato de abiraterona	250 mg	Comprimido	SES	SES	SES	ACP Oncologia
acetato de ciproterona	50 mg	Comprimido	1B	MS	SES	PCDT Puberdade Precoce Central; PCDT Síndrome de Ovários Policístico
acetato de desmopressina	0,1mg/mL	solução nasal	1A	MS	SES	PCDT Diabetes insípido
	0,1mg	Comprimido	1A	MS	SES	PCDT Diabetes insípido
	0,2 mg	Comprimido	1A	MS	SES	PCDT Diabetes insípido
acetato de fludrocortisona	0,1mg	Comprimido	2	SES	SES	PCDT Hiperplasia Adrenal Congênita; PCDT Insuficiência Adrenal
Acetato de glatirâmer	20 mg	Solução injetável	1A	MS	SES	PCDT Esclerose Múltipla
	40 mg	Solução injetável	1A	MS	SES	PCDT Esclerose Múltipla
acetato de goserrelina	10,8 mg	Implante subcutâneo	1B	MS	SES	PCDT Endometriose; PCDT Leiomioma de Útero; PCDT Puberdade Precoce Central

Acetato de lanreotida	60 mg	solução injetável	1A	MS	SES	PCDT Acromegalia
	90 mg	solução injetável	1A	MS	SES	PCDT Acromegalia
	120 mg	solução injetável	1A	MS	SES	PCDT Acromegalia
acetato de leuprorrelina	3,75mg	pó para suspensão injetável	1B	MS	SES	PCDT Endometriose; PCDT Leiomioma de Útero; PCDT Puberdade Precoce Central
	45 mg	pó para suspensão injetável	1B	MS	SES	PCDT Endometriose; PCDT Leiomioma de Útero; PCDT Puberdade Precoce Central
Acetato de octreotida	10 mg	pó para suspensão injetável	1B	MS	SES	PCDT Acromegalia
	20 mg	pó para suspensão injetável	1A	MS	SES	PCDT Acromegalia
	30 mg	pó para suspensão injetável	1A	MS	SES	PCDT Acromegalia
	150 mg	Comprimido	1B	MS	SES	PCDT Colangite Biliar Primária
Ácido ursodesoxicólico	300 mg	Comprimido	1B	MS	SES	PCDT Colangite Biliar Primária
	5mg/100mL	solução injetável	2	SES	SES	PCDT Doença de Paget
Ácido zoledrônico	5mg/100mL	solução injetável	SES	SES	SES	ACP Osteoporose
	10 mg	Cápsula	1B	MS	SES	PCDT Ictioses Hereditárias; PCDT Psoríase; PCDT Outras malformações da pele

adalimumabe	25mg	Cápsula	1B	MS	SES	PCDT Ictioses Hereditárias; PCDT Psoríase; PCDT Outras malformações da pele
	40 mg	Seringa preenchida	1A	MS	SES	PCDT Artrite Psoriásica; PCDT Artrite Reumatoide; PCDT Doença de Crohn; PCDT Espondilite Ancilosante; PCDT Hidradenite Supurativa; PCDT Psoríase; PCDT Uveítes não Infecciosas; PCDT Artrite Idiopática Juvenil
alentuzumabe	10 mg/mL	solução injetável	1A	MS	SES	PCDT Esclerose Múltipla
alfa- alglicosidade	50 mg	pó para solução injetável	1A	MS	SES	PCDT Doença de Pompe
alfadornase	1mg/mL	solução para inalação	1A	MS	SES	PCDT Fibrose Cística – Manifestações pulmonares
alfaelossulfase	5mg	solução injetável	1A	MS	SES	PCDT Mucopolissacaridose Tipo IV A
alfaepoetina	4.000 unidades internacionais	pó para solução injetável	1A	MS	SES	PCDT Anemia na Doença Renal Crônica- Alfaepoetina
	10.000 unidades internacionais	pó para solução injetável	1A	MS	SES	PCDT Anemia na Doença Renal Crônica- Alfaepoetina; PCDT Hepatite C e coinfeções; PCDT Síndrome Mielodisplásica de Baixo Risco
Alfainterferona 2B	3.000.000 unidades internacionais	pó para solução injetável	1B	MS	SES	PCDT Hemangioma Infantil

alfataliglicerase	5.000.000 unidades internacionais	pó para solução injetável	1B	MS	SES	PCDT Hemangioma Infantil
	10.000.000 unidades internacionais	pó para solução injetável	1B	MS	SES	PCDT Hemangioma Infantil
	200unidades	pó para solução injetável	1A	MS	SES	PCDT Doença de Gaucher
	400unidades	pó para solução injetável	1A	MS	SES	PCDT Doença de Gaucher
alfavestronidase	2 mg/mL	solução injetável	1A	MS	SES	PCDT Mucopolissacaridose VII
alfatirotopina	1,1mg	Frasco-ampola	SES	SES	SES	ACP Oncologia
anfotericina B lipossomal	50 mg	Pó para solução injetável	SES	SES	SES	Resolução CIB-PBNº09, DE 3 DE FEVEREIRO DE 2019
ambrisentana	5mg	Comprimido	1B	MS	SES	PCDT Hipertensão Arterial Pulmonar
	10 mg	Comprimido	1B	MS	SES	PCDTHipertensãoArterial Pulmonar
Atorvastatina cálcica	10 mg	Comprimido	2	SES	SES	PCDT Dislipidemia: prevenção de eventos cardiovasculares e pancreatite
	20 mg	Comprimido	2	SES	SES	PCDT Dislipidemia: prevenção de eventos cardiovasculares e pancreatite
	40 mg	Comprimido	2	SES	SES	PCDT Dislipidemia: prevenção de eventos cardiovasculares e pancreatite
azatioprina	50 mg	Comprimido	2	SES	SES	PCDT Artrite Reumatoide; PCDT



baricitinibe						Dermatomiosite e Polimiosite; PCDT Doença de Crohn; PCDT Esclerose Múltipla; PCDT Hepatite autoimune; PCDT Imunossupressão no Transplante Cardíaco; PCDT Imunossupressão no Transplante Hepático em Adultos; PCDT Imunossupressão no Transplante Hepático em Pediatria; PCDT Imunossupressão em Transplante Renal; PCDT Lúpus Eritematoso Sistêmico; PCDT Miastenia Gravis; PCDT Púrpura Trombocitopênica Idiopática; PCDT Retocolite Ulcerativa; PCDT Uveítes não Infeciosas; PCDT Esclerose Sistêmica; PCDT de Artrite Idiopática Juvenil
	2 mg	Comprimido	1A	MS	SES	PCDT Artrite Reumatoide
	4 mg	Comprimido	1A	MS	SES	PCDT Artrite Reumatoide
Betainterferona 1a	22 Microgramas (6.000.000 Unidades internacionais)	Solução injetável	1A	MS	SES	PCDT Esclerose Múltipla
	30 Microgramas (6.000.000 Unidades internacionais)	solução injetável	1A	MS	SES	PCDT Esclerose Múltipla
	44 Microgramas (12.000.000)	Solução injetável	1A	MS	SES	PCDT Esclerose Múltipla

betainterferona1b	unidades internacionais )					
	300 microgramas(9.600.000 unidades internacionais )	pó para solução injetável	1A	MS	SES	PCDT Esclerose Múltipla
bevacizumabe	100 mg (4 mL)	Frasco-ampola	SES	SES	SES	ACP Oncologia
	400 mg (4 mL)	Frasco-ampola	SES	SES	SES	ACP Oncologia
biotina	2,5mg	cápsula	1A	MS	SES	PCDT Deficiência de Biotinidase
bosentana	62,5mg	Comprimido	1B	MS	SES	PCDT Hipertensão Arterial Pulmonar
	125mg	Comprimido	1B	MS	SES	PCDT Hipertensão Arterial Pulmonar
brometo de piridostigmina	60 mg	Comprimido	2	SES	SES	PCDT Miastenia Gravis
brometo de tiotrópio monodratado + cloridrato de olodaterol	2,5 mcg + 2,5 mcg	Solução para inalação	1B	MS	SES	PCDT Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica
brometo de umeclidínio + de vilanterol	62,5mcg+ 25mcg	pó para inalação	1B	MS	SES	PCDT Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica
Bromidrato de galantamina	8 mg	cápsula de liberação prolongada	1A	MS	SES	PCDT Doença de Alzheimer
	16 mg	cápsula de liberação prolongada	1A	MS	SES	PCDT Doença de Alzheimer
	24 mg	cápsula de liberação prolongada	1A	MS	SES	PCDT Doença de Alzheimer

budesonida	200 microgramas	Cápsula para inalação	2	SES	SES	PCDT Asma; PCDT Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica
	400 microgramas	Cápsula para inalação	2	SES	SES	PCDT Asma; PCDT Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica
burosumabe	10 mg/mL	solução injetável	1A	MS	SES	PCDT Raquitismo e Osteomalácia
	20 mg/mL	solução injetável	1A	MS	SES	Hipofosfatemia ligada ao cromossomo X em crianças
	30 mg/mL	solução injetável	1A	MS	SES	Hipofosfatemia ligada ao cromossomo X em crianças
cabergolina	0,5mg	Comprimido	1A	MS	SES	PCDT Acromegalia; PCDT Hiperprolactinemia
calcipotriol	50 microgramas/g(0,005%)	pomada	2	SES	SES	PCDT Psoríase
calcitonina	200 unidades internacionais/dose	Solução spray nasal	2	SES	SES	PCDT Doença de Paget; PCDT Osteoporose
calcitriol	0,25 microgramas	cápsula mole	2	SES	SES	PCDT Distúrbio Mineral Ósseo na Doença Renal Crônica; PCDT Hipoparatiroidismo; PCDT Osteoporose; PCDT Raquitismo e Osteomalácia
Certolizumabe pegol	200 mg	solução injetável	1A	MS	SES	PCDT Artrite Psoriaca; PCDT Artrite Reumatoide; PCDT Doença de Crohn; PCDT Espondilite Ancilosante
ciclofosfamida	50 mg	Comprimido	2	SES	SES	PCDT Anemia Hemolítica Autoimune; PCDT Aplasia Pura Adquirida Crônica da Série Vermelha; PCDT



ciclosporina						Esclerose Sistêmica; PCDT Lúpus Eritematoso Sistêmico; PCDT Púrpura Trombocitopênica Idiopática; PCDT Síndrome Nefrótica Primária em Adultos; PCDT Síndrome Nefrótica Primária em Crianças e Adolescentes; PCDT de Síndrome de Falência Medular
	25mg	cápsula	2	SES	SES	PCDT Síndrome de Falência Medular; PCDT Anemia Hemolítica Autoimune; PCDT Aplasia Pura Adquirida Crônica da Série Vermelha; PCDT Artrite Psoriática; PCDT Artrite Reumatoide; PCDT Artrite Idiopática Juvenil; PCDT Dermatite e Polimiosite; PCDT Imunossupressão no Transplante Cardíaco; PCDT Imunossupressão no Transplante Hepático em Adultos; PCDT Imunossupressão no Transplante Hepático em Pedriatria; PCDT Imunossupressão em Transplante Renal; PCDT Lúpus Eritematoso Sistêmico; PCDT Miastenia Gravis; PCDT Psoríase; PCDT Retocolite Ulcerativa; PCDT Síndrome Nefrótica Primária em criança e adolescentes; PCDT Síndrome Nefrótica Primária em Crianças e



						Adolescentes; PCDT Uveítes não Infecciosas
	50 mg	cápsula	2	SES	SES	PCDT Síndrome de Falência Medular; PCDT Anemia Hemolítica Autoimune; PCDT Aplasia Pura Adquirida Crônica da Série Vermelha; PCDT Artrite Psoriática; PCDT Artrite Reumatoide; PCDT Artrite Idiopática Juvenil; PCDT Dermatômiosite e Polimiosite; PCDT Imunossupressão no Transplante Cardíaco; PCDT Imunossupressão no Transplante Hepático em Adultos; PCDT Imunossupressão no Transplante Hepático em Pediatria; PCDT Imunossupressão em Transplante Renal; PCDT Lúpus Eritematoso Sistêmico; PCDT Miastenia Gravis; PCDT Psoríase; PCDT Retocolite Ulcerativa; PCDT Síndrome Nefrótica Primária em criança e adolescentes; PCDT Síndrome Nefrótica Primária em Adultos; PCDT Uveítes não Infecciosas
	100 mg	cápsula	2	SES	SES	PCDT Síndrome de Falência Medular; PCDT Anemia Hemolítica Autoimune; PCDT Aplasia Pura Adquirida Crônica da Série Vermelha; PCDT Artrite Psoriática; PCDT Artrite Reumatoide; PCDT



						Artrite Idiopática Juvenil; PCDT Dermatomiosite e Polimiosite; PCDT Imunossupressão no Transplante Cardíaco; PCDT Imunossupressão no Transplante Hepático em Adultos; PCDT Imunossupressão no Transplante Hepático em Pedriatria; PCDTImunossupressão emTransplante Renal; PCDT Lúpus Eritematoso Sistêmico; PCDT Miastenia Gravis; PCDT Psoríase; PCDT Retocolite Ulcerativa; PCDT Síndrome Nefrótica Primária em criança e adolescentes; PCDT Síndrome Nefrótica Primária em Adultos; PCDT Uveítes não Infecciosas
	100 mg/mL	Solução oral	2	SES	SES	PCDT Síndrome de Falência Medular; PCDT Anemia Hemolítica Autoimune; PCDT Aplasia Pura Adquirida Crônica da Série Vermelha; PCDT Artrite Psoriaca; PCDT Artrite Reumatoide; PCDT Artrite Idiopática Juvenil; PCDT Dermatomiosite e Polimiosite; PCDT Imunossupressão no Transplante Cardíaco; PCDT Imunossupressão no Transplante Hepático em Adultos; PCDT Imunossupressão no Transplante Hepático

						em Pediatria; PCDT Imunossupressão em Transplante Renal; PCDT Lúpus Eritematoso Sistêmico; PCDT Miastenia Gravis; PCDT Psoríase; PCDT Retocolite Ulcerativa; PCDT Síndrome Nefrótica Primária em criança e adolescentes; PCDT Síndrome Nefrótica Primária em Adultos; PCDT Uveítes não Infecciosas
ciprofibrato	100 mg	Comprimido	2	SES	SES	PCDT Dislipidemia: prevenção de eventos cardiovasculares e pancreatite
citrato de sildenafil	20 mg	Comprimido	1A	MS	SES	PCDT Hipertensão Arterial Pulmonar
	25mg	Comprimido	1A	MS	SES	PCDT Esclerose Sistêmica
	50 mg	Comprimido	1A	MS	SES	PCDT Esclerose Sistêmica
cladribina	10 mg	10 mg	1A	MS	SES	PCDT Esclerose Múltipla
clobazam	10 mg	Comprimido	2	SES	SES	PCDT Epilepsia
	20 mg	Comprimido	2	SES	SES	PCDT Epilepsia
clopidogrel	75mg	Comprimido	2	SES	SES	Protocolo Clínico de Síndromes Coronarianas Agudas
Cloridrato de amantadina	100 mg	Comprimido	2	SES	SES	PCDT Doença de Parkinson
Cloridrato de cinacalcete	30 mg	Comprimido	1A	MS	SES	PCDT Distúrbio MineralÓsseo na Doença Renal Crônica

cloridrato de donepezila	60 mg	Comprimido	1A	MS	SES	PCDT Distúrbio Mineral Ósseo na Doença Renal Crônica
	5mg	Comprimido	1A	MS	SES	PCDT Doença de Alzheimer
	10 mg	Comprimido	1A	MS	SES	PCDT Doença de Alzheimer
Cloridrato de metadona	5mg	Comprimido	2	SES	SES	PCDT Dor Crônica
	10 mg	Comprimido	2	SES	SES	PCDT Dor Crônica
Cloridrato de raloxifeno	60 mg	Comprimido	2	SES	SES	PCDT Osteoporose
Cloridrato de sevelâmer	800 mg	Comprimido	1A	MS	SES	PCDT Distúrbio Mineral Ósseo na Doença Renal Crônica
clozapina	25mg	Comprimido	1A	MS	SES	PCDT Doença de Parkinson; PCDT Esquizofrenia; PCDT Transtorno Afetivo Bipolar do tipo I; PCDT Transtorno Esquizoafetivo
	50 mg	Comprimido	1A	MS	SES	PCDT Doença de Parkinson; PCDT Esquizofrenia; PCDT Transtorno Afetivo Bipolar do tipo I; PCDT Transtorno Esquizoafetivo
Complemento alimentar para paciente fenilcetonúrico maior de 1 ano (fórmula de aminoácidos sem fenilalanina)	Complemento alimentar para paciente fenilcetonúrico maior de 1 ano (fórmula de aminoácidos isenta de fenilalanina)		2	SES	SES	PCDT Fenilcetonúria; PCDT de Transplante de Medula ou Pâncreas; PCDT Transplante de Pulmão



danazol	Complemento alimentar para paciente fenilcetonúrico menor de 1ano (fórmula de aminoácido sissenita de fenilalanina)		2	SES	SES	PCDT Fenilcetonúria; PCDT de Transplante de Medula ou Pâncreas; PCDT Transplante de Pulmão
	100 mg	cápsula	2	SES	SES	PCDT Angioedema associado à deficiência de C1 esterase; PCDT Endometriose; PCDT Lúpus Eritematoso Sistêmico; PCDT Púrpura Trombocitopênica Idiopática
	200 mg	cápsula	2	SES	SES	PCDT Angioedema associado à deficiência de C1 esterase; PCDT Endometriose; PCDT Lúpus Eritematoso Sistêmico; PCDT Púrpura Trombocitopênica Idiopática
dapagliflozina	10 mg	Comprimido	2	SES	SES	PCDT de Diabetes Mellito Tipo 2; PCDT das Estratégias para Atenuar a Progressão da Doença Renal Crônica; PCDT de Insuficiência Cardíaca com Fração de Ejeção Reduzida
deferasirox	125mg	Comprimido para suspensão	1A	MS	SES	PCDT Sobrecarga de Ferro
	250 mg	Comprimido para suspensão	1A	MS	SES	PCDT Sobrecarga de Ferro
	500 mg	Comprimido para suspensão	1A	MS	SES	PCDT Sobrecarga de Ferro
deferiprona	500 mg	Comprimido	1B	MS	SES	PCDT Sobrecarga de Ferro
dicloridrato de pramipexol	0,125mg	Comprimido	1A	MS	SES	PCDT Doença de Parkinson



eculizumabe	0,25mg	Comprimido	1A	MS	SES	PCDT Doença de Parkinson
	1mg	Comprimido	1A	MS	SES	PCDT Doença de Parkinson
	10 mg/mL	Solução para diluição para infusão	1A	MS	SES	PCDT Hemoglobinúria Paroxística Noturna
Elexacaftor/ tezacaftor/ ivacaftor	100 mg +50mg+ 75mg	Comprimido	1A	MS	SES	PCDT da Fibrose Cística
Eltrombopague olamina	25mg	Comprimido	1B	MS	SES	PCDT Púrpura Trombocitopênica Idiopática; PCDT de Síndrome de Falência Medular
	50 mg	Comprimido	1B	MS	SES	PCDT Púrpura Trombocitopênica Idiopática; PCDT de Síndrome de Falência Medular
enoxaparinásó dica	40 mg	solução injetável	1A	MS	SES	PCDT Prevenção de Tromboembolismo Venoso em Gestantes com Trombofilia
	60 mg	solução injetável	1A	MS	SES	PCDT Prevenção de Tromboembolismo Venoso em Gestantes com Trombofilia
entacapona	200 mg	Comprimido	1A	MS	SES	PCDT Doença de Parkinson
etanercepte	25mg	solução injetável	1A	MS	SES	PCDT Artrite Psoriática; PCDT Artrite Reumatoide; PCDT Artrite Idiopática Juvenil; PCDT Espondilite Ancilosante; PCDT Psoríase
	50 mg	solução injetável	1A	MS	SES	PCDT Artrite Psoriática; PCDT Artrite Reumatoide; PCDT Artrite Idiopática Juvenil; PCDT Espondilite Ancilosante; PCDT Psoríase
etossuximida	50 mg/mL	xarope	2	MS	SES	PCDT Epilepsia



everolimo	0,5mg	Comprimido	1A	MS	SES	PCDT Imunossupressão no Transplante Cardíaco; PCDT Imunossupressão no Transplante Hepático em Adultos; PCDT Imunossupressão no Transplante Hepático em Pediatria; PCDT Imunossupressão em Transplante Renal
	0,75mg	Comprimido	1A	MS	SES	PCDT Imunossupressão no Transplante Cardíaco; PCDT Imunossupressão no Transplante Hepático em Adultos; PCDT Imunossupressão no Transplante Hepático em Pediatria; PCDT Imunossupressão em Transplante Renal
	1mg	Comprimido	1A	MS	SES	PCDT Imunossupressão no Transplante Cardíaco; PCDT Imunossupressão no Transplante Hepático em Adultos; PCDT Imunossupressão no Transplante Hepático em Pediatria; PCDT Imunossupressão em Transplante Renal
Fenoximetilpenicilina potássica	80.000 UI/ML pó para solução 60 ml	Solução injetável	MS	MS	SES	PCDT Doença falciforme
filgrastim	300 microgramas	Solução injetável	1A	MS	SES	PCDT Anemia Aplástica, Mielodisplasia e Neutropenias Constitucionais – Uso de Fatores Estimulantes de Crescimento de Colônias de Neutrófilos; PCDT Hepatite C e coinfeções; PCDT Síndrome de Falência Medular

fangolimode	0,5mg	Comprimido	1A	MS	SES	PCDT Esclerose Múltipla
fosfatode codeína	30 mg	Comprimido	2	SES	SES	PCDT Dor Crônica
	60 mg	Comprimido	2	SES	SES	PCDT Dor Crônica
	3mg/mL	Solução oral	2	SES	SES	PCDT Dor Crônica
fumaratode di metila	120 mg	Cápsula	1A	MS	SES	PCDT Esclerose Múltipla
	240 mg	Cápsula	1A	MS	SES	PCDT Esclerose Múltipla
fumarato de formoterol	12 microgramas	Cápsula para inalação	2	SES	SES	PCDT Asma; PCDT Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica
fumarato de formoterol + budesonida	6 microgramas + 200 microgramas	Cápsula para inalação	2	SES	SES	PCDT Asma; PCDT Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica
	12 microgramas + 400 Inalação microgramas	Cápsula para inalação	2	SES	SES	PCDT Asma; PCDT Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica
gabapentina	300 mg	cápsula	2	MS	SES	PCDT Epilepsia, PCDT Dor Crônica
	400 mg	cápsula	2	MS	SES	PCDT Epilepsia, PCDT Dor Crônica
galsulfase	5mg	solução injetável	1A	MS	SES	PCDT Mucopolissacaridose Tipo VI
golimumabe	50 mg	solução injetável	1A	MS	SES	PCDT Artrite Psoriaca; PCDT Artrite Reumatoide; PCDT Espondilite Ancilosante
Hemifumarato de quetiapina	25mg	Comprimido	1A	MS	SES	PCDT Esquizofrenia; PCDT Transtorno Afetivo Bipolar do tipo I; PCDT Transtorno Esquizoafetivo

hidroxiureia	100 mg	Comprimido	1A	MS	SES	PCDT Esquizofrenia; PCDT Transtorno Afetivo Bipolar do tipo I; PCDT Transtorno Esquizoafetivo
	200 mg	Comprimido	1A	MS	SES	PCDT Esquizofrenia; PCDT Transtorno Afetivo Bipolar do tipo I; PCDT Transtorno Esquizoafetivo
	300 mg	Comprimido	1A	MS	SES	PCDT Esquizofrenia; PCDT Transtorno Afetivo Bipolar do tipo I; PCDT Transtorno Esquizoafetivo
idursulfase	500 mg	cápsula	1B	MS	SES	PCDT Doença Falciforme
iloprosta	2 mg/mL	Solução injetável	1A	MS	SES	PCDT Mucopolissacaridose do tipo II
imiglucerase	10 microgramas/mL	Solução para nebulização	1B	MS	SES	PCDT Hipertensão Arterial Pulmonar
Imunoglobulina humana	400 unidades	Pó para solução injetável	1A	MS	SES	PCDT Doença de Gaucher
	5g	Solução injetável	1A	MS	SES	PCDT Anemia Hemolítica Autoimune; PCDT de Síndrome de Falência Medular; PCDT Aplasia Pura Adquirida Crônica da série vermelha; PCDT Dermatomiosite e Polimiosite; PCDT Imunodeficiência Primária com predominância de defeitos de anticorpos; PCDT Imunossupressão em Transplante Renal; PCDT Miastenia Gravis; PCDT Púrpura



infiximabe						Trombocitopênica Idiopática; PCDT Síndrome de Guillain-Barré
	100 mg	pó para solução injetável	1A	MS	SES	PCDT Artrite Psoriaca; PCDT Artrite Reumatoide; PCDT Artrite Idiopática Juvenil; PCDT Doença de Crohn; PCDT Espondilite Ancilosante; PCDT Retocolite Ulcerativa
insulina análoga de ação prolongada	100 unidades internacionais/ mL	Solução injetável com sistema de aplicação	1A	MS	SES	PCDT Diabetes Melito Tipo 1
	100 unidades internacionais/ mL	Solução injetável com sistema de aplicação	SES	SES	SES	ACP Diabetes Melito Tipo 2
insulina análoga de ação rápida	100 unidades internacionais/ mL	Solução injetável com sistema de aplicação	1A	MS	SES	PCDT Diabetes Melito Tipo 1
	100 unidades internacionais/ mL	Solução injetável com sistema de aplicação	SES	SES	SES	ACP Diabetes Melito Tipo 2
isotretinoína	10 mg	cápsula mole	2	SES	SES	Protocolo de uso da isotretinoína no tratamento da acne grave
	20 mg	cápsula mole	2	SES	SES	Protocolo de uso da isotretinoína no tratamento da acne grave

ivacaftor	150 mg	Comprimido	1A	MS	SES	PCDT Fibrose Cística- Manifestações pulmonares
lamotrigina	25mg	Comprimido	2	SES	SES	PCDT Epilepsia; PCDT Transtorno Afetivo Bipolar do tipo I
	50 mg	Comprimido	2	SES	SES	PCDT Epilepsia; PCDT Transtorno Afetivo Bipolar do tipo I
	100 mg	Comprimido	2	SES	SES	PCDT Epilepsia; PCDT Transtorno Afetivo Bipolar do tipo I
laronidase	0,58 mg/mL	solução injetável	1A	MS	SES	PCDT Mucopolissacaridose do tipo I
leflunomida	20 mg	Comprimido	1A	MS	SES	PCDT Artrite Psoríaca; PCDT Artrite Reumatoide; PCDT Artrite Idiopática Juvenil
levetiracetam	250 mg	Comprimido	1A	MS	SES	PCDT Epilepsia
	750 mg	Comprimido	1A	MS	SES	PCDT Epilepsia
	100 mg/mL	solução oral	1A	MS	SES	PCDT Epilepsia
Malato de sunitinibe	12,5mg	cápsula	SES	SES	SES	ACP Oncologia
	25mg	cápsula	SES	SES	SES	ACP Oncologia
	50 mg	cápsula	SES	SES	SES	ACP Oncologia
memantina	10 mg	Comprimido	1A	MS	SES	PCDT Doença de Alzheimer
mepolizumabe	100 mg/mL	pó para solução injetável	1B	SES	SES	PCDT Asma
Mesalazina	400 mg	Comprimido	2	SES	SES	PCDT Doença de Crohn; PCDT Retocolite Ulcerativa



mesilato de desferroxamina	500 mg	Comprimido de liberação prolongada	2	SES	SES	PCDT Doença de Crohn; PCDT Retocolite Ulcerativa
	800 mg	Comprimido	2	SES	SES	PCDT Doença de Crohn; PCDT Retocolite Ulcerativa
	250 mg	Supositório retal	2	SES	SES	PCDT Doença de Crohn; PCDT Retocolite Ulcerativa
	500 mg	Supositório retal	2	SES	SES	PCDT Doença de Crohn; PCDT Retocolite Ulcerativa
	1.000 mg	Supositório retal	2	SES	SES	PCDT Doença de Crohn; PCDT Retocolite Ulcerativa
	10 mg/mL	Enema retal	2	SES	SES	PCDT Doença de Crohn; PCDT Retocolite Ulcerativa
	2g	Grânulos de liberação prolongada (sachê)	2	SES	SES	PCDT Retocolite Ulcerativa
mesilato de rasagilina	500 mg	pó para solução injetável	1B	MS	SES	PCDT Distúrbio Mineral Ósseo na Doença Renal Crônica; PCDT Sobrecarga de Ferro
mesilato de rasagilina	1mg	Comprimido	1A	MS	SES	PCDT Doença de Parkinson
metotrexato	25mg/mL	Solução injetável	1A	MS	SES	PCDT Artrite Psoriática; PCDT Artrite Reumatoide; PCDT Artrite Idiopática Juvenil; PCDT Dermatômiosite e Polimiosite; PCDT Esclerose Sistêmica; PCDT Espondilite Ancilosante; PCDT Lúpus Eritematoso Sistêmico; PCDT Psoríase; PCDT da Doença de Crohn
	2,5mg	Comprimido	1A	MS	SES	PCDT Artrite Psoriática; PCDT Artrite Reumatoide; PCDT Artrite Idiopática



micofenolato de mofetila						Juvenil; PCDT Dermatiosite e Polimiosite; PCDT Esclerose Sistêmica; PCDT Espondilite Ancilosante; PCDT Lúpus Eritematoso Sistêmico; PCDT Psoríase
	500 mg	Comprimido	1A	MS	SES	PCDT Imunossupressão no Transplante Cardíaco; PCDT Imunossupressão no Transplante Hepático em Adultos; PCDT Imunossupressão no Transplante Hepático em Pediatria; PCDT Imunossupressão em Transplante Renal; PCDT Lúpus Eritematoso Sistêmico
micofenolato de sódio	180 mg	Comprimido	1A	MS	SES	PCDT Imunossupressão no Transplante Cardíaco; PCDT Imunossupressão no Transplante Hepático em Adultos; PCDT Imunossupressão no Transplante Hepático em Pediatria; PCDT Imunossupressão em Transplante Renal
	360 mg	Comprimido	1A	MS	SES	PCDT Imunossupressão no Transplante Cardíaco; PCDT Imunossupressão no Transplante Hepático em Adultos; PCDT Imunossupressão no Transplante Hepático em Pediatria; PCDT Imunossupressão em Transplante Renal



miglustate	100 mg	cápsula	1A	MS	SES	PCDT Doença de Gaucher
naproxeno	250 mg	Comprimido	2	SES	SES	PCDT Artrite Psoriática; PCDT Artrite Reativa; PCDT Artrite Reumatoide; PCDT Artrite Idiopática Juvenil; PCDT Espondilite Ancilosante
	500 mg	Comprimido	2	SES	SES	PCDT Artrite Psoriática; PCDT Artrite Reativa; PCDT Artrite Reumatoide; PCDT Artrite Idiopática Juvenil; PCDT Espondilite Ancilosante
natalizumabe	20 mg/mL	solução injetável	1A	MS	SES	PCDT Esclerose Múltipla
nusinersena	2,4 mg/mL	solução injetável	1A	MS	SES	PCDT Atrofia Muscular Espinhal 5q Tipo 1 e Atrofia Muscular Espinhal 5q Tipo 2
olanzapina	5mg	Comprimido	1A	MS	SES	PCDT Esquizofrenia; PCDT Transtorno Afetivo Bipolar do tipo I; PCDT Transtorno Esquizoafetivo
	10 mg	Comprimido	1A	MS	SES	PCDT Esquizofrenia; PCDT Transtorno Afetivo Bipolar do tipo I; PCDT Transtorno Esquizoafetivo
omalizumabe	150 mg	Solução injetável	1B	MS	SES	PCDT Asma
Pamidronato dissódico	60 mg	Solução injetável	2	SES	SES	PCDT Osteoporose

pancreatina	10.000 Unidades internacionais	cápsula	1B	MS	SES	PCDT Fibrose Cística- Insuficiência Pancreática; PCDT Insuficiência Pancreática Exócrina
	25.000 Unidades internacionais	cápsula	1B	MS	SES	PCDT Fibrose Cística- Insuficiência Pancreática; PCDT Insuficiência Pancreática Exócrina
paricalcitol	5 microgramas/m L	solução injetável	1A	MS	SES	PCDT Distúrbio Mineral Ósseo na Doença Renal Crônica
penicilamina	250 mg	cápsula	1B	MS	SES	PCDT Doença de Wilson
primidona	100 mg	Comprimido	2	SES	SES	PCDT Epilepsia
propionato de clobetasol	0,5mg/g	creme	2	SES	SES	PCDT Psoríase
	0,5mg/g	Solução capilar	2	SES	SES	PCDT Psoríase
riluzol	50 mg	Comprimido	1A	MS	SES	PCDT Esclerose Lateral Amiotrófica
risanquizumabe	75mg/0,83 mL	Solução injetável	1A	MS	SES	PCDT Psoríase
risedronatos ódico	35mg	Comprimido	2	SES	SES	PCDT Doença de Paget; PCDT Osteoporose
risperidona	1mg/mL	solução oral	1B	MS	SES	PCDT Comportamento Agressivo no Transtorno do Espectro do Autismo
	1mg	Comprimido	1B	MS	SES	PCDT do Comportamento Agressivo no Transtorno do Espectro do Autismo; PCDT Transtorno Afetivo Bipolar do tipol; PCDT Transtorno Esquizoafetivo; PCDT Esquizofrenia
	2 mg	Comprimido	1B	MS	SES	PCDT do Comportamento Agressivo no Transtorno do Espectro do Autismo; PCDT Transtorno Afetivo Bipolar do tipol; PCDT Transtorno Esquizoafetivo; PCDT Esquizofrenia

rituximabe	3mg	Comprimido	1B	MS	SES	PCDT do Comportamento Agressivo no Transtorno do Espectro do Autismo; PCDT Transtorno Afetivo Bipolar do tipo I; PCDT Transtorno Esquizoafetivo; PCDT Esquizofrenia
	10 mg/mL	solução injetável	1A	MS	SES	PCDT Artrite Reumatoide
	10 mg/mL	solução injetável	SES	SES	SES	ACP Oncologia
rivastigmina	50 mg/mL	solução injetável	SES	SES	SES	ACP Oncologia
	1,5mg	cápsula	1A	MS	SES	PCDT Doença de Alzheimer
	3mg	cápsula	1A	MS	SES	PCDT Doença de Alzheimer
	4,5mg	cápsula	1A	MS	SES	PCDT Doença de Alzheimer
	6 mg	cápsula	1A	MS	SES	PCDT Doença de Alzheimer
	9mg	Adesivo transdérmico	1A	MS	SES	PCDT Doença de Alzheimer
	18 mg	Adesivo transdérmico	1A	MS	SES	PCDT Doença de Alzheimer
	2 mg/mL	Solução oral	1B	MS	MS	PCDT Doença de Alzheimer
	20 mg/mL	solução injetável	1B	MS	SES	PCDT Anemia na Doença Renal Crônica-Reposição de Ferro
Sacubitril valsartana sódica	50 mg	Comprimido	1B	MS	SES	Diretrizes Brasileiras para Diagnóstico e Tratamento da Insuficiência Cardíaca com Fração de Ejeção Reduzida
	100 mg	Comprimido	1B	MS	SES	Diretrizes Brasileiras para Diagnóstico e Tratamento da



secuquinumabe						Insuficiência Cardíaca com Fração de Ejeção Reduzida
	200 mg	Comprimido	1B	MS	SES	Diretrizes Brasileiras para Diagnóstico e Tratamento da Insuficiência Cardíaca com Fração de Ejeção Reduzida
	150 mg/ml	pó para solução injetável	1A	MS	SES	PCDT Artrite Psoriaca; PCDT Espondilite Ancilosante; PCDT Psoríase
sirolimo	1mg	Comprimido	1A	MS	SES	PCDT Imunossupressão no Transplante Hepático em Pediatria; PCDT Imunossupressão em Transplante Renal; PCDT Linfangioleiomiomatose
somatropina	2 mg	Comprimido	1A	MS	SES	PCDT Imunossupressão no Transplante Hepático em Pediatria; PCDT Imunossupressão em Transplante Renal; PCDT Linfangioleiomiomatose
	4 unidades internacionais	pó para solução injetável	1A	MS	SES	PCDT Deficiência do Hormônio de Crescimento; PCDT Síndrome de Turner
	12 unidades internacionais	pó para solução injetável	1A	MS	SES	PCDT Deficiência do Hormônio de Crescimento; PCDT Síndrome de Turner
sulfassalazina	500 mg	Comprimido	2	SES	SES	PCDT Artrite Psoriaca; PCDT Artrite Reativa; PCDT Artrite Reumatoide; PCDT Artrite Idiopática Juvenil; PCDT Doença De Crohn; PCDT



sulfato de hidroxycloquina						Espondilite Ancilosante; PCDT Retocolite Ulcerativa
	400 mg	Comprimido	2	SES	SES	PCDT Artrite Reumatoide; PCDT Dermatomiosite e Polimiosite; PCDT Lúpus Eritematoso Sistêmico; PCDT Artrite Idiopática Juvenil
sulfato de morfina	10 mg	Comprimido	2	SES	SES	PCDT Dor Crônica
	30 mg	Comprimido	2	SES	SES	PCDT Dor Crônica
tacrolimo	10 mg/mL	Solução injetável	2	SES	SES	PCDT Dor Crônica
	1mg	cápsula	1A	MS	SES	PCDT Imunossupressão no Transplante Cardíaco; PCDT Imunossupressão no Transplante Hepático em Adultos; PCDT Imunossupressão no Transplante Hepático em Pediatria; PCDT Síndrome Nefrótica Primária em Crianças e Adolescentes; PCDT de Imunossupressão no Transplante Renal
	5mg	cápsula	1A	MS	SES	PCDT Imunossupressão no Transplante Cardíaco; PCDT Imunossupressão no Transplante Hepático em Adultos; PCDT Imunossupressão no Transplante Hepático em Pediatria; PCDT Síndrome Nefrótica Primária em Crianças e Adolescentes; PCDT de Imunossupressão no Transplante Renal
tafamidis	20 mg	cápsula	1A	MS	SES	PCDT Polineuropatia Amiloidótica Familiar



Talidomida	100 mg	Comprimido	MS	MS	SES	PCDT Mieloma Múltiplo; PCDT Lúpus Eritematoso Sistêmico
tamoxifeno	20 mg	Comprimido	SES	SES	SES	ACP Oncologia
temozolamida	5mg	cápsula	SES	SES	SES	ACP Oncologia
	20 mg	cápsula	SES	SES	SES	ACP Oncologia
	100 mg	cápsula	SES	SES	SES	ACP Oncologia
	250 mg	cápsula	SES	SES	SES	ACP Oncologia
teriflunomida	14 mg	Comprimido	1A	MS	SES	PCDT Esclerose Múltipla
tobramicina	300 mg	Solução inalatória	1A	MS	SES	PCDT Fibrose Cística– Manifestações Pulmonares
tocilizumabe	20 mg/mL	solução injetável	1A	MS	SES	PCDT Artrite Reumatoide; PCDT Artrite Idiopática Juvenil
tofacitinibe	5mg	Comprimido	1A	MS	SES	PCDT Artrite Psoríaca; PCDT Artrite Reumatoide; PCDT Retocolite ulcerativa
topiramato	25mg	Comprimido	2	SES	SES	PCDT Epilepsia
	50 mg	Comprimido	2	SES	SES	PCDT Epilepsia
	100 mg	Comprimido	2	SES	SES	PCDT Epilepsia
tosilato de sorafenibe	200 mg	Comprimido	SES	SES	SES	ACP Oncologia
Toxina botulínica A	100unidades	pó para solução injetável	1A	MS	SES	PCDT Distonias e Espasmo Hemifacial; PCDT Espasticidade
	500unidades	pó para solução injetável	1A	MS	SES	PCDT Distonias e Espasmo Hemifacial; PCDT Espasticidade
triptorrelina	3,75mg	pó para suspensão injetável	1B	MS	SES	PCDT Endometriose; PCDT Leiomioma deÚtero; PCDT Puberdade Precoce Central
	22,5mg	pó para	1B	MS	SES	PCDT Endometriose;



		suspensão injetável				PCDT Leiomioma deÚtero; PCDT Puberdade Precoce Central
upadacitinibe	15mg	Comprimido revestido de liberação prolongada	1A	MS	SES	PCDT Artrite Reumatoide
ustequinumabe	45mg	solução injetável	1A	MS	SES	PCDT Psoríase
vedolizumabe	300 mg	solução injetável	1A	MS	SES	PCDT de Retocolite Ulcerativa
vigabatrina	500 mg	Comprimido	2	SES	SES	PCDT Epilepsia
Ziprasidona	40 mg	Comprimido	1A	MS	SES	PCDT Esquizofrenia; PCDT Transtorno Esquizoafetivo
	80 mg	Comprimido	1A	MS	SES	PCDT Esquizofrenia; PCDT Transtorno Esquizoafetivo





# ANEXOS

## ANEXO1

## GUIA DE ORIENTAÇÃO AO USUÁRIO DE MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS

## 1. MEDICAMENTO

- ABIRATERONA\*
- ALFATIROTROPINA\*
- BEVACIZUMABE\*
- BORTEZOMIBE\*
- RITUXIMABE\*
- SORAFENIBE\*
- SUNITINIBE\*
- TAMOXIFENO\*
- TEMOZOLAMIDA\*
- TRASTUZUMABE\*

\*versituações clínicas sujeitas a aprovação

## 2. DOCUMENTOS A SEREM APRESENTADO (CÓPIAS AUTENTICADAS)

## DOCUMENTOS PESSOAIS

- ( ) Carteira de identidade – RG  
( ) Cadastro de Pessoa Física – CPF  
( ) Cartão Nacional de Saúde – CNS  
( ) Comprovante de Residência - Contade Água, Luz, Telefone ou Declaração de Residência em nome do Usuário ( )  
Declaração Autorizadora autenticada em cartório, caso deseje credenciar representante para receber os medicamentos

SOLICITAÇÃO INICIAL	RENOVAÇÃO MENSAL
<ul style="list-style-type: none"><li>• Prescrição médica devidamente preenchida e datada com no máximo 30 dias</li><li>• Laudomédico com descrição clínica dos sinais e sintomas de acordo com o CID da doença.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Prescrição médica devidamente preenchida e datada com no máximo 30 dias</li><li>• Laudomédico com descrição clínica dos sinais e sintomas de acordo com o CID</li><li>• Agendamento do hospital com data e horário da infusão do medicamento.</li></ul>

## SOLICITAÇÃO INICIAL

- Exame Anátomo Patológico/Biópsia
- Exames específicos para cada tipo de tumor de acordo com o protocolo da doença.

## 3. OBSERVAÇÕES

A resposta à Solicitação será emitida em **até 15 (quinze) dias**;

Os documentos para renovação do tratamento devem ser apresentados com antecedência de 30 (trinta) dias;

Os documentos (Relatório Médico, Receita Médico), deverão ser emitidos com todos os campos preenchidos de forma legível em acordo com a legislação vigente;



## MEDICAMENTOS ANTINEOPLÁSICOS FORNECIDOS PELAS ES/PB

MEDICAMENTO	LOCALIZAÇÃO	INDICAÇÃO
ABIRATERONA	PRÓSTATA	Metastático resistente à castração (mCRPC) que são assintomáticos ou levemente sintomáticos, após falha à terapia de privação androgênica.
		Avançado metastático resistente à castração (mCRPC) que recebe quimioterapia prévia com docetaxel*.
		Metastático de alto risco, com diagnóstico recente, não tratados anteriormente com hormônios (mHNPC) ou pacientes que estavam em tratamento hormonal por não mais que três meses e continuam respondendo à terapia hormonal (mHSPC).
BEVACIZUMABE	COLO-RETO	Carcinoma metastático colorretal em combinação com quimioterapia à base de fluoropirimidina*.
	PULMÃO DE NÃO PEQUENAS CÉLULAS	Em combinação com quimioterapia à base de platina* como tratamento de primeira linha de pacientes com câncer de pulmão de não pequenas células, não escamoso, irrissecável, localmente avançado, metastático ou recorrente.
		Em combinação com erlotinibe* (fornecido pelo hospital), para o tratamento de primeira linha de pacientes com câncer de pulmão de não pequenas células, não escamoso, irrissecável, avançado, metastático ou recorrente com mutações ativadoras de EGFR (receptor do fator de crescimento epidérmico).
MAMA	Em combinação com paclitaxel*, para o tratamento em primeira linha de pacientes com câncer de mama localmente recorrente ou metastático que não tenham recebido quimioterapia prévia para doença metastática ou localmente recorrente.	



		Em combinação com capecitabina, para o tratamento em primeira linha de pacientes com câncer de mama localmente recorrente ou metastático para os quais o tratamento com outras opções de quimioterapia, incluindo taxanos e antraciclinas, não seja considerado apropriado. Pacientes que tenham recebido regimes de tratamento adjuvante contendo taxanos e antraciclinas nos últimos 12 meses não são elegíveis ao tratamento com Avastin® em combinação com capecitabina.
	RIM	Em combinação com a interferona 2 <sup>a</sup> , é indicado para o tratamento de primeira linha de pacientes com câncer de células renais avançado e/ou metastático.
	OVÁRIO, TUBA UTERINA E PERITÔNIO	Em combinação com carboplatina* e paclitaxel*, para o tratamento de primeira linha de pacientes com câncer epitelial de ovário, tuba uterina e peritoneal primário avançados (International Federation of Gynecology and Obstetrics – FIGO – III B, III C e IV).
		Em combinação com carboplatina* e gencitabina*, para o tratamento de pacientes adultos com câncer epitelial de ovário, tuba uterina e peritoneal primário com primeira recorrência e sensível à platina, sem terapia prévia com bevacizumabe ou outros inibidores de VEGF ou agentes direcionados a receptores de VEGF.
		Em combinação com carboplatina* e paclitaxel*, é indicado para o tratamento de pacientes adultos com câncer epitelial primário de ovário, tuba uterina e peritônio, recorrente e sensível à platina.
		Em combinação com paclitaxel*, topotecana* ou doxorubicina lipossomal peguilada*, é indicado para o tratamento de pacientes com câncer epitelial de ovário, tuba uterina e peritoneal primário, recorrentes e resistentes à platina, que não tenham recebido mais do que dois regimes prévios de quimioterapia e que não receberam terapia prévia com bevacizumabe ou outros inibidores de VEGF ou agentes direcionados a receptores de VEGF.
	ÚTERO	Em combinação com paclitaxel* e cisplatina* ou, alternativamente, paclitaxel* e topotecana* em pacientes que não podem receber terapia com platina, é indicado para o tratamento de câncer de colo do útero persistente, recorrente ou metastático.



<b>BEVACIZUMABE</b>		
<b>RITUXIMABE</b>	SANGUE(LINFONODOS)	PacientescomlinfomanãoHodgkindecélulasB,baixograuoufolicular,CD20positivo,recidivadoouresistenteàquimioterapia;
	*CID's: C82.0; C82.1;C82.2;C82.7;C82.9e C83.3 devemdescrever em laudomédico oestadiamento.(EstagioslelIdevemreceber pelo HospitaldeCancer)	PacientescomlinfomanãoHodgkindifusodegrandescélulasB,CD20positivo,emcombinaçãoàquimioterapiaCHOP; PacientescomlinfomanãoHodgkindecélulasB,folicular,CD20positivo,nãotratadospreviamente,emcombinaçãoocomquimioterapia;
		Pacientescomlinfomafolicular,comotratamentodemanutenção,apósrespostaàterapiadeindução
	MEDULAÓSSEA	Emcombinaçãoocomquimioterapianãotratadospreviamentecomrecaída/refratáriaaotratamento.
<b>SORAFENIBE</b>	RINS	Tratamentodepacientescomcarcinomacelularrenalavançadoquenãoresponderamàterapiacomalfainterferona*ouinterleucina-2*ounãoeramelegíveis paratalterapia.
	FÍGADO	Tratamentodepacientescomcarcinoma hepatocelularnãoressecável.
	TIREÓIDE	Tratamentodepacientescomcarcinomadetireoidediferenciado(papilífero,folicular,céluladeHurthle)localmenteavançado oumetastático,progressivo,refratário aiodoradioativo.
<b>SUNITINIBE</b>	TUMOR ESTROMALGASTROINTESTINAL(GIST)	Tratamentodetumorestromalgastrintestinal(GIST)apósfalhadotratamentocommesilatodeimatiniibeemdecorrênciaderesistênciaouintolerância.



	RIM	Tratamentodecarcinomametastáticodecélulasrenais(CCRm)avançado
		Tratamentoadjuvantedepacientesadultoscomaltoriscodecarcinomadecélulasrenais(CCR)recorrenteapósnefrectomia.
	SARCOMAS	Tratamento de pacientes adultos com subtipos específicos de sarcoma de partes moles (STS) avançado que receberamquimioterapiapréviaparadoençametastáticaouquetenhamprogredidodentrode12mesesapósaterapianeoadjuvant eouadjuvante.
TAMOXIFENO*	MAMA	Carcinomaductal <i>insitu</i> demamacomtumoresreceptores hormonalpositivo.
TEMOZOLAMIDA	SISTEMA NERVOSO CENTRAL	Glioblastomamultiformerecém-diagnosticadoconcomitantementeàradioterapiaeemadjuvânciaposterior.
	SISTEMA NERVOSO CENTRAL	Gliomamaligno,talcomoglioblastomamultiformeouastrocitomaanaplásico,recidivanteouprogressivoapósterapiapadrão.
	PELE	Tratamentodepacientescommelanomamalignometastáticoemestágioavançado.
ALFATIROTROPINA	TIREÓIDE	Ferramentacoadjuvantediagnósticaparadosagemdetireoglobulinasérica(Tg)com/semcintilografiadecorpoiteirocomiodoradoativo,empregadaparaadeteçãodetecidosremanescentesdetireoideedecâncerdetireoidebemdiferenciadoempacientespós-tireoidectomizados,emterapiadesupressãocomhormônio da tireoide(TSHT).
		Tratamento coadjuvante paraablação poriodo radioativode tecidosremanescentesde tireoideempacientesque sesubmeteram atireoidectomiatotalousubtotal porcâncerdetireoide bemdiferenciado.

## ANEXO2

## GUIA DE ORIENTAÇÃO AO PORTADOR DE OSTEOPOROSE GRAVE

## 1. Medicamentos

- Ácido Zoledrônico 5 mg/100 ml. - (Tratamento disponível quando **comprovada a falha terapêutica aos demais medicamentos de 2ª linha, disponíveis no SUS (componente Especializado - CEDMEX)**; Também disponível quando **comprovada a contraindicação de tratamentos de 2ª linha, disponíveis no SUS**);
- Denosumabe 60 mg/ml - Tratamento disponível quando existir **contraindicação ao uso de Ácido Zoledrônico; devendo o usuário ter utilizado medicamentos de 2ª linha, disponíveis no SUS (componente Especializado - CEDMEX)**;
- Teriparatida 250 mcg - (Tratamento disponível para pacientes com alto risco de fraturas);

## 2. Documentos a serem apresentados (Cópias autenticadas)

## Documentos pessoais

- ( ) Carteira de Identidade - RG
- ( ) Cadastro de Pessoa Física - CPF
- ( ) Cartão Nacional de Saúde - CNS
- ( ) Comprovante de Residência - Conta de Água, Luz, Telefone ou Declaração de Residência **em nome do Usuário**
- ( ) Declaração Autorizadora, caso deseje credenciar representante para receber os medicamentos

## Solicitação inicial

- **Prescrição médica:** com posologia para 3 meses de tratamento emitida por médico especialista (**Endocrinologista, Geriatra, Reumatologista, Ginecologista e Ortopedista**) vinculados às unidades de saúde ou credenciadas à rede SUS. Deverá conter todos os campos em letra legível ou digitalizada com posologia diária, tempo de tratamento, data de prescrição, assinatura e carimbo do médico prescritor.
- **Laudo Médico:** deverá conter nome completo do paciente, idade, histórico clínico da patologia, CID, contraindicações ou não ao uso de outros medicamentos indicados a mesma patologia, risco de fratura ou fratura estabelecida, valor de T-score, histórico de quedas frequentes ou fatores que predispõem a queda e informações sobre se o usuário possui insuficiência renal ou não. Laudos sem fundamentação e justificativa não serão avaliados.

## Solicitação inicial - Ácido zoledrônico

- Densitometria Óssea datada de no máximo 12 meses;
- Exames Creatinina sérica e Clearance de Creatinina;
- Endoscopia **para os casos de comprovação de doença do refluxo gastroesofágico, esofagite, gastrite**, ou qual impede o usuário de fazer uso de medicamento por via oral;
- **Comprovação de utilização** de tratamentos disponíveis pelo SUS (Componente Especializado - CEDMEX).
- Densitometria anterior à inicial do processo que **comprova insucesso terapêutico, descrito no laudo médico, ou de outras terapias.**

## Solicitação inicial - Denosumabe

- Densitometria Óssea datada de no máximo 12 meses;
- Endoscopia para os **casos de comprovação de doença do refluxo gastroesofágico, esofagite, gastrite**, ou qual impede o usuário de fazer uso de medicamento por via oral;
- Raios-X da coluna dorsal lombar, para comprovação de fraturas osteopóticas;
- Exames Creatinina sérica e Clearance de Creatinina;
- **Comprovação de utilização** de tratamentos disponíveis pelo SUS (Componente Especializado - CEDMEX).
- Densitometria anterior à inicial do processo que **comprova insucesso terapêutico, descrito no laudo médico, ou de outras terapias.**

## Solicitação inicial - Teriparatida



- Densitometria Óssea datada de no máximo 12 meses;
- **Raios-X da**
- **colunadora lombar, para comprovação de fraturas de causas osteoporóticas;** Exames: Cálcio e P  
otássio sérico;  
Paratormônio (PTH);

### 3. Observações

A resposta à Solicitação será emitida em até **30 (trinta) dias**;

Na ausência dos dados solicitados, assim como de documentos necessários o processo poderá ser indeferido até que sejam sanadas as pendências.

Os documentos deverão ser emitidos com todos os campos preenchidos de forma legível em acordo com a legislação vigente.



## ANEXO3

**GUIA DE ORIENTAÇÃO AO USUÁRIO DE ANÁLOGOS DE INSULINAS  
(CID10: E10.2;E10.3;E10.4;E10.5;E10.6;E10.7; E10.8;E10.9; E11,024.4;024.9)**

**1. Medicamento**

Insulina Asparte 100UI/mL (Novorapid®) Insulina Glargina 100UI/mL (Lantus®)
---

**2. Documentos a serem apresentados (Original e cópia autenticada)  
Documentos pessoais**

- |   |
|---|
| <input type="checkbox"/> Carteira de Identidade – RG<br><input type="checkbox"/> Cadastro de Pessoa Física – CPF<br><input type="checkbox"/> Cartão Nacional de Saúde – CNS<br><input type="checkbox"/> Comprovante de Residência - Contate Água, Luz, Telefone ou Declaração de Residência em nome do Usuário<br><input type="checkbox"/> Declaração Autorizadora, caso deseje credenciar representante para receber os medicamentos |
|---|

Solicitação inicial	Renovação a cada 3 (três) meses
<input type="checkbox"/> Relatório médico que descreva o quadro clínico do paciente, elaborado por endocrinologista, onde conste: <input checked="" type="checkbox"/> Anodo diagnóstico; <input checked="" type="checkbox"/> Tipo de diabetes; Peso e idade <input checked="" type="checkbox"/> <b>Histórico de utilização anterior de insulinas NPH e Regular;</b> <input checked="" type="checkbox"/> Histórico do controle glicêmico; v Na ocorrência de hipoglicemias, descrever frequência (por mês), gravidade, horário e não percepção; <input type="checkbox"/> Receituário Médico para tratamento para 3 meses, datado e original. Não será aceito cópia.	<input type="checkbox"/> Receituário Médico de Endocrinologista ou médico da Unidade Básica de Saúde para tratamento para 3 meses datado e original. Não será aceita cópia; <input type="checkbox"/> Relatório Médico totalmente preenchido e legível <input type="checkbox"/> Comprovante de Residência atualizado.  Obs. Para alterações de dosagem serão aceitas apenas prescrições médicas elaboradas por endocrinologistas mediante relatório médico justificando a alteração.
O paciente com prescrição de altas doses de análogos de insulina (acima de 80UI/dia de análogos de longa duração e acima de 40UI/dia de análogos de curta duração), deverá apresentar: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Relatório médico justificando a dose prescrita e os critérios clínicos laboratoriais que levaram ao diagnóstico de Diabetes; assim como informar se o paciente apresenta resistência insulínica.</li> <li>• Informar o peso atual do paciente para afeição de cálculo da dose/kg que está sendo utilizada.</li> </ul>	

Solicitação inicial	Renovação
---------------------	-----------



<p>( ) Hemoglobina Glicosilada – AC1 ou Hemoglobina Glicada, no mínimo <b>2 exames consecutivos</b>, com intervalo máximo de 6 meses, referentes aos últimos 12 meses, sendo o último exame realizado no máximo há 60 dias;</p> <p>( ) Glicemia em jejum - no mínimo <b>2 exames consecutivos</b>, com intervalo máximo de 6 meses, referentes aos últimos 12 meses, sendo o último exame realizado no máximo há 90 dias;</p> <p>( ) Glicemia – pós prandial no mínimo <b>2 exames consecutivos</b>, com intervalo máximo de 6 meses, referentes aos últimos 12 meses, sendo o último exame realizado no máximo há 90 dias;</p>	<p><b>A cada 3 (três) meses</b> ( ) Glicemia em jejum <b>A cada 6 (seis) meses</b> ( ) Glicemia em jejum ( ) Glicemia Pós Prandial ( ) Hemoglobina Glic osilada</p> <p><b>A cada 12 (doze) meses</b> ( ) Perfil Lipídico; ( ) Creatinina; ( ) Microalbuminúria (opc ional); ( ) Exame do pésemca so de neuropatia.</p>
---	--



	( ) Fundoscopia.
--	------------------

### 3. Observações

A resposta à Solicitação será emitida em até 30 (trinta) dias;

Os documentos para renovação do tratamento devem ser apresentados com antecedência de 30 (trinta) dias; 3.3 Os documentos (Relatório Médico, Receita Médica e Laudo Médico), deverão ser emitidos com todos os campos preenchidos de forma legível em acordo com a legislação vigente;

**RELATÓRIO MÉDICO PARA USODE INSULINAS ANÁLOGAS: AÇÃO PROLONGADA E RÁPIDA**

SOLICITAÇÃO ( ) Glargina ( ) Asparte

Nome: \_\_\_\_\_ Processo \_\_\_\_\_

Data de Nascimento: \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_ Telefone: \_\_\_\_\_ Anodo diagnóstico \_\_\_\_\_

Tipo de DM:  DM Tipo 1  DM Tipo 2  DM + Gestação CID10 \_\_\_\_\_ Cartão SUS \_\_\_\_\_

Região de Saúde \_\_\_\_\_ Unidade de Saúde \_\_\_\_\_ Peso do Paciente \_\_\_\_\_

Posologia prescrita: Insulina Glargina: \_\_\_\_\_  
Insulina Aspartw: \_\_\_\_\_**Critério 1 - Falha ou esquema prévio com insulinas (um dos itens)**

- Insulina de ação intermediária (NPH), associada à insulina rápida ou ultrarrápida  
 Insulina em pré-mistura  
 Insulina regular (para indicação isolada de ultrarrápida)

**Avaliação farmacoterapêutica: histórico anterior de uso de insulinas NPH e/ou Regular**

Nome Genérico	Dose	Início	Fim	Motivo de Suspensão

**Critério 2 - Persistente mau controle registrado nos últimos 6 meses, segundo a SBD, SBEM, SBPC/ML, FENAD 2009 (assinalar qual) – comprovado – exames de Glicemia em jejum e pós prandial**Glicemia em jejum acima de 140 mg/mL  Sim \_\_\_\_\_  Não \_\_\_\_\_  
Glicemia pós prandial acima de 180 mg/ml  Sim \_\_\_\_\_  Não \_\_\_\_\_**Critério 3 - Persistente mau controle registrado nos últimos 6 meses, segundo a SBD, SBEM, SBPC/ML, FENAD 2009 (assinalar qual) – comprovado - 2A1C (HPLC) dos últimos 12 meses:**

- A1C acima de 8.5% (0 – 6 anos)  A1C (HPLC) acima de 8% (6 – 12 anos; acima de 65 anos)  
 A1C acima de 7.5% (13 – 19 anos)  A1C acima de 8.5% (20 – 64 anos)

**Critério 4 - Hipoglicemia grave (um dos itens):**

- Glicemia < 50 mg/dL (2 episódios em 6 meses, requerendo ajuda de terceiros ou atendimento hospitalar)  
 Hipoglicemia despercebida (polineuropatia periférica - disautonomia: alteração da contra regulação hormonal com ausência de sintomas neuroadrenérgicos à hipoglicemia).

Obs.: os dados devem ser relatados pelo médico assistente e registrados em exames laboratoriais, consultas de emergência ou em glicosímetros, curvas de monitorização contínua de glicose. OBRIGATÓRIA A APRESENTAÇÃO DO RELATÓRIO MÉDICO.

**Critério 5 – Outras condições clínicas especiais (relatórios do especialista anexados):**

- DM + Gestação
- DMG requerendo insulino terapia
- DM Tipo 1 - Já em uso de análogos de ação prolongada e/ou fora das metas de controle, segundo o critério 2 e iniciando insulino terapia com análogos de ação prolongada e ultrarrápida

- Polineuropatia autonômica: gastroparesia (comprovada por exame complementar ou relatório clínico)
- Hepatopatia
  - Neoplasia - Tratamento radio ou quimioterápico
  - Nefropatia (*clearance* de creatinina abaixo de 30 mL/min) ou macroalbuminúria acima de 300 mg/min) ou em tratamento dialítico
  
  - Doença coronariana aguda ou crônica e cardiopatia crônica
  - Doença arterial periférica grave (ITB < 0.5, úlcera ativa) e amputação

**Justificativa para solicitação dos análogos: Descrever evolução e eventuais efeitos adversos**

---

---

---

---

---

Para a 1ª Solicitação, transcreva os resultados dos exames/leituras nos últimos 6 meses (2 últimos exames)

Exame	Data	Resultado	Data	Resultado
Glicose em Jejum		Mg/dL		Mg/dL
Glicemia Pós Prandial		Mg/dL		Mg/dL
Hemoglobina Glicada		Mg/dL		Mg/dL

---

**Atenção:** a prescrição médica deve ser renovada antes da reavaliação para a continuidade e terá validade de 6 meses.



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE  
COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE

RESOLUÇÃO CIB-PB Nº 019, DE 03 DE FEVEREIRO DE 2020

*Aprova a atualização da relação dos medicamentos para tratamento e profilaxia das Infecções Oportunistas (IO) em pacientes portadores do HIV/AIDS e para Tratamento das Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST).*

A Comissão Intergestores Bipartite, no uso de suas atribuições, e:

Considerando a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, que dispõe sobre as condições para a promoção, a proteção e a recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências;

Considerando o Decreto nº 7.508, de 28 de junho de 2011, que regulamenta a Lei nº 8.080, de 1990, para dispor sobre a organização do Sistema Único de Saúde, o planejamento da saúde, a assistência à saúde e a articulação interfederativa;

Considerando o anexo III da Portaria de Consolidação nº 4, de 28 de setembro de 2017, que regulamenta as responsabilidades e define diretrizes para execução e financiamento das ações de Vigilância em Saúde pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, relativos ao Sistema Nacional de Vigilância em Saúde e Sistema Nacional de Vigilância Sanitária;

Considerando a Portaria nº 3.276/GM/MS de 26 de dezembro de 2013, que regulamenta o incentivo financeiro de custeio às ações de vigilância, prevenção e controle das DST/AIDS e Hepatites Virais;

Considerando o protocolo clínico e diretrizes terapêuticas para manejo da infecção pelo HIV em adultos;

Considerando o protocolo clínico e diretrizes terapêuticas para Atenção Integral às Pessoas com Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST);

Considerando a necessidade de atualização do elenco de medicamentos para tratamento e profilaxia das Infecções Oportunistas - IO em Pacientes Portadores do HIV/AIDS, Tratamento das Infecções

Sexualmente Transmissíveis - IST para o Estado da Paraíba e repactuação da sua aquisição pela SES- PB e municípios;

Considerando a decisão da plenária da CIB-PB, na 1ª Reunião Ordinária, em 03 de fevereiro de 2020, realizada em João Pessoa/PB.

**RESOLVE:**

**Art. 1º** Aprovar a atualização da relação dos medicamentos para tratamento e profilaxia das Infecções Oportunistas - IO em pacientes portadores do HIV/AIDS e para Tratamento das Infecções Sexualmente Transmissíveis - IST, conforme Anexo.

**Art. 2º** Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.



**GERALDO ANTÔNIO DE MEDEIROS**  
Presidente da CIB/PB



**SORAYA GALDINO DE ARAUJO LUCENA**  
Presidente do COSEMS/PB


Anexo I da Resolução CIB Nº 19/2020

Novo elenco para medicamentos para Infecções Oportunistas.

<b>MEDICAMENTOS / SITUAÇÃO CLÍNICA</b>	<b>ESTADO</b>	<b>MUNICÍPIOS</b>
Medicamentos para tratamento das Infecções Oportunistas (IO)	Ácido fólico 15mg comprimido	Ácido fólico 5mg
	Dapsona 100mg comprimido	Aciclovir 200mg comprimido
	Ganciclovir 250 mg e 500 mg, comprimido	Albendazol 40mg/ml suspensão oral
	Itraconazol 100mg cápsula	Albendazol 400mg comprimido
	Sulfadiazina 500mg	Amoxicilina + Clavulanato de potássio 500mg+125 mg cápsula
	Aciclovir sódico 250mg -pó para solução injetável (Âmbito Hospitalar)	Amoxicilina + Clavulanato de potássio 50mg/ml+12,5mg/ml suspensão oral
	Anfotericina B desoxicolato 50mg (Âmbito Hospitalar)	Cloridrato de Clindamicina 150mg e 300mg cápsula
	Anfotericina B, Lipossomal (Âmbito Hospitalar)	Fluconazol 100 e 150mg cápsula
	Anfotericina B, Complexo Lipídico (Âmbito Hospitalar)	Itraconazol 100mg cápsula
	Ganciclovir 500mg frasco-ampola injetável (Âmbito Hospitalar)	Sulfametoxazol 400mg/trimetoprima 80mg oral.
	Micafungina (Âmbito Hospitalar)	
Fluconazol bolsa (Âmbito Hospitalar)	Fluconazol bolsa (Âmbito Hospitalar)	



**GERALDO ANTONIO DE MEDEIROS**  
Presidente da CIB/PB



**SORAYA GALDINO DE ARAUJO LUCENA**  
Presidente do COSEMS/PB






Anexo II da Resolução CIB Nº 19/2020

Novo elenco para medicamentos para Infecções Sexualmente Transmissíveis.

SITUAÇÃO CLÍNICA	ESTADO	MUNICÍPIOS
Medicamentos para infecções sexualmente transmissíveis (IST)	Doxiciclina 100mg comprimido	Aciclovir 200mg comprimido
		Azitromicina 500mg comprimido
		Cloridrato de Ciprofloxacino 250mg e 500mg comprimido
		Fluconazol 150mg cápsula
		Metronidazol 100mg/g 10% gel vaginal,
	Ceftriaxona 1g pó para solução injetável IV (Âmbito Hospitalar)	Metronidazol 250 ou 400 mg comprimidos
		Nitrato de miconazol 20mg/g (2%) creme vaginal
		Benzilpenicilina benzatina 1.200.000 UI pó para suspensão injetável
		Benzilpenicilina procaína + benzilpenicilina potássica 300.000 UI + 100.000 UI pó para suspensão injetável
		Benzilpenicilina potássica 5.000.000 UI pó para suspensão injetável (uso hospitalar)*

  
**GERALDO ANTONIO DE MEDEIROS**  
Presidente da CIB/PB

  
**SORAYA GALDINO DE ARAUJO LUCENA**  
Presidente do COSEMS/PB



**2023**