

Paciente: \_\_\_\_\_

**Selecionar a classificação dos subtipos de AIJ:**

Subtipo de AIJ	Crítérios
Sistêmico	<input type="checkbox"/> 1. Artrite <input type="checkbox"/> 2. Febre (> 15 dias, documentada por pelo menos 3 dias na semana) <input type="checkbox"/> 3. Mais outra manifestação extra-articular: <i>rash</i> , serosite, hepatomegalia, esplenomegalia, linfonodomegalia generalizada
AIJ oligoarticular	<input type="checkbox"/> 1. Uma a 4 articulações com artrite nos 6 primeiros meses de doença
AIJ poliarticular FR positivo	<input type="checkbox"/> 1. Mais de 4 articulações acometidas nos primeiros 6 meses de doença <input type="checkbox"/> 2. Fator reumatoide positivo em 2 testes com intervalo de 3 ou mais meses
AIJ poliarticular FR negativo	<input type="checkbox"/> 1. Mais de 4 articulações nos primeiros 6 meses (grandes e pequenas articulações) <input type="checkbox"/> 2. Fator reumatoide negativo
Artrite psoriaca	<input type="checkbox"/> 1. Artrite e Psoríase Ou <input type="checkbox"/> 2. Artrite e 2 dos seguintes: dactilite, alteração ungueal (pequenas depressões puntiformes nas unhas ou onicólise), parente do primeiro grau com psoríase
Artrite relacionada a entesite	<input type="checkbox"/> 1. Artrite e entesite Ou <input type="checkbox"/> 2. Artrite ou entesite + 2 dos seguintes: HLA B27 positivo, dor lombo-sacra inflamatória ou dor a digito-pressão de sacroilíacas, início da artrite no sexo masculino, pacientes com mais de 6 anos, uveíte anterior aguda, parente de 1 <sup>o</sup> . grau com doença ligada ao HLAB27: espondilite anquilosante, artrite relacionada a entesite, doença intestinal inflamatória com sacroiliite, artrite reativa, uveíte anterior aguda.
Artrite indiferenciada	<input type="checkbox"/> 1. Pacientes que não preenchem critérios de inclusão de nenhum dos 6 subtipos. Ou <input type="checkbox"/> 2. Pacientes que preenchem critérios para mais de um dos 6 subtipos

**O paciente apresenta algum dos itens abaixo? Se sim, marque um X no item:**

1. Psoríase ou história de psoríase em paciente ou parente de 1 <sup>o</sup> grau
2. Artrite com início em paciente com mais de seis anos, do sexo masculino e presença de HLA-B27
3. Espondilite anquilosante, artrite relacionada a entesite, sacroiliite com artrite inflamatória intestinal, síndrome de artrite reativa, uveíte anterior aguda ou história de uma dessas doenças em um parente de 1 <sup>o</sup> grau
4. Presença de fator reumatoide IgM em duas ocasiões, com intervalo superior a 3 meses
5. Presença de artrite sistêmica no paciente

\_\_\_\_\_  
Carimbo e assinatura do(a) médico(a)

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data