



PCDT: DERMATITE ATÓPICA
CID 10: L20.0, L20.8

PACIENTE: _____

ANEXO II - Os critérios de Hanifin e Rajka são abrangentes e geralmente considerados o “padrão de ouro” para o diagnóstico de Dermatite atópica.

Marcar com X		Critérios maiores (3 ou mais)
	1	Prurido
	2	Morfologia e distribuição típicas: 2.1 Liquenificação ou linearidade de superfícies flexoras em adultos 2.2 Envolvimento de face ou de superfícies extensoras em bebês e crianças
	3	Dermatite crônica ou cronicamente recidivante
	4	História pessoal ou familiar de atopia, como asma, rinite alérgica, dermatite atópica
Marcar com X		Critérios menores (3 ou mais):
	1	Xerose
	2	Ictiose/hiperlinearidade palmar/queratose pilar
	3	Reatividade imediata (tipo 1) do teste cutâneo
	4	Imunoglobulina E sérica elevada
	5	Idade precoce de início
	6	Tendência para infecções cutâneas (S. aureus e herpes simples vírus) /imunidade prejudicada, mediada por células
	7	Tendência para dermatite não específica da mão ou do pé
	8	Eczema do mamilo
	9	Queilite
	10	Conjuntivite recorrente
	11	Dobra infraorbitária de Dennie-Morgan
	12	Ceratocone
	13	Catarata subcapsular anterior
	14	Escurecimento órbita
	15	Palidez facial/eritema facial
	16	Pitíriase alba
	17	Dobra cervical anterior
	18	Prurido ao suar
	19	Intolerância à lã e solventes lipídicos
	20	Acentuação perifolicular
	21	Intolerância alimentar
	22	Influência do curso por fatores ambientais/emocionais
	23	Dermografismo branco/branqueamento tardio

Assinatura e carimbo do médico

Data: ____ / ____ / _____.