

GERÊNCIA:

Executiva Vigilância em Saúde

GERÊNCIA OPERACIONAL:

Vigilância Epidemiológica

NÚCLEO:

Imunização

NOTA INFORMATIVA Nº 09 - 01 de abril de 2022

Assunto: Trata-se da ampla divulgação da atualização de Nota Informativa nº 04/2022.


Considerando Nota Informativa nº 04 de 28 de fevereiro de 2022 que divulgou a Nota Técnica nº 11/2022-SECOVID/GAB/SECOVID/MS;

Considerando Nota Técnica Nº 22/2022-SECOVID/GAB/SECOVID/MS atualiza a Nota Técnica nº 11/2022-SECOVID/GAB/SECOVID/MS, a qual tem por objetivo consolidar as Notas Técnicas referente a vacinação da população maior de 12 anos.

Esta Coordenação Estadual de Imunizações:

- 1) Vem apresentar detalhamento das estratégias de imunização contra a Covid-19 em pessoas a partir de 12 anos de idade, referente ao esquema primário e dose de reforço de vacinas contra COVID-19, conforme esquemas vacinais em anexo;

A Equipe da Coordenação Estadual de Imunização se coloca à disposição para as orientações relativas às informações requeridas e outros esclarecimentos, fone: (83) 3211-9052 e e-mail: pni@ses.pb.gov.br.

Atenciosamente,

Isiane Queiroga S. Cândido
Chefe do Núcleo de Imunização
Matrícula: 174.870-0


Talita Tavares Alves de Almeida
Gerente Executiva de Vigilância em Saúde
Mat. 173.656-6

GERÊNCIA:

Executiva Vigilância em Saúde

GERÊNCIA OPERACIONAL:

Vigilância Epidemiológica

NÚCLEO:

Imunização

ANEXOS – ESQUEMAS VACINAIS POR FAIXA ETÁRIA

1. A PARTIR DE 18 ANOS, NÃO GESTANTES OU PUÉRPERAS

ESQUEMA PRIMÁRIO		REFORÇO (REF)	
D1	D2	Intervalo	Imunizante
Coronavac	4 semanas após D1	4 meses após D2	Astrazeneca, Janssen ou Pfizer
Astrazeneca	8 semanas após D1	4 meses após D2	Astrazeneca, Janssen ou Pfizer
Pfizer	8 semanas após D1	4 meses após D2	Astrazeneca, Janssen ou Pfizer
Janssen	NÃO indicada	2 meses após D	Astrazeneca, Janssen ou Pfizer

2. A PARTIR DE 18 ANOS, IMUNOCOMPROMETIDO, NÃO GESTANTES OU PUÉRPERAS

ESQUEMA PRIMÁRIO		DOSE ADICIONAL (DA)		REFORÇO (REF)	
D1	D2	Intervalo	Imunizante	Intervalo	Imunizante
Coronavac	4 semanas após D1	8 semanas após D2	Coronavac	4 meses após DA	Astrazeneca, Janssen ou Pfizer
Astrazeneca	8 semanas após D1	8 semanas após D2	Astrazeneca	4 meses após DA	Astrazeneca, Janssen ou Pfizer
Pfizer	8 semanas após D1	8 semanas após D2	Pfizer	4 meses após DA	Astrazeneca, Janssen ou Pfizer
Janssen	NÃO indicada	8 semanas após D	Janssen	4 meses após DA	Astrazeneca, Janssen ou Pfizer

GERÊNCIA:

Executiva Vigilância em Saúde

GERÊNCIA OPERACIONAL:

Vigilância Epidemiológica

NÚCLEO:

Imunização

3. A PARTIR DE 80 ANOS

ESQUEMA PRIMÁRIO		REFORÇO 1 (REF)		REFORÇO 2 (R2)	
D1	D2	Intervalo	Imunizante	Intervalo	Imunizante
Coronavac	4 semanas após D1	4 meses após D2	Astrazeneca, Janssen ou Pfizer	4 meses após REF	Preferencialmente Pfizer, de maneira alternativa Janssen ou AstraZeneca
Astrazeneca	8 semanas após D1	4 meses após D2	Astrazeneca, Janssen ou Pfizer	4 meses após REF	
Pfizer	8 semanas após D1	4 meses após D2	Astrazeneca, Janssen ou Pfizer	4 meses após REF	
Janssen	NÃO indicada	2 meses após D	Astrazeneca, Janssen ou Pfizer	4 meses após REF	

4. A PARTIR DE 18 ANOS, GESTANTES OU PUÉRPERAS

ESQUEMA PRIMÁRIO		REFORÇO (REF)	
D1	D2	Intervalo	Imunizante
Coronavac	4 semanas após D1	4 meses após D2	Preferencialmente Pfizer, se não disponível, utilizar Coronavac
Pfizer	8 semanas após D1	4 meses após D2	Preferencialmente Pfizer, se não disponível, utilizar Coronavac

5. A PARTIR DE 18 ANOS, GESTANTES OU PUÉRPERAS IMUNOCOMPROMETIDAS

ESQUEMA PRIMÁRIO		DOSE ADICIONAL (DA)		REFORÇO (REF)	
D1	D2	Intervalo	Imunizante	Intervalo	Imunizante
Coronavac	4 semanas após D1	8 semanas após D2	Coronavac	4 meses após DA	Preferencialmente Pfizer, se não disponível, utilizar Coronavac
Pfizer	8 semanas após D1	8 semanas após D2	Pfizer	4 meses após DA	Preferencialmente Pfizer, se não disponível, utilizar Coronavac



GERÊNCIA:

Executiva Vigilância em Saúde

GERÊNCIA OPERACIONAL:

Vigilância Epidemiológica

NÚCLEO:

Imunização

6. DE 12 A 17 ANOS, NÃO GESTANTES OU PUÉRPERAS

ESQUEMA PRIMÁRIO		REFORÇO (REF)
D1	D2	
Coronavac	4 semanas após D1	Não indicado
Pfizer	8 semanas após D1	Não indicado

7. DE 12 A 17 ANOS, GESTANTES OU PUÉRPERAS

ESQUEMA PRIMÁRIO		REFORÇO (REF)	
D1	D2	Intervalo	Imunizante
Coronavac	4 semanas após D1	4 meses após D2	Preferencialmente Pfizer, se não disponível, utilizar Coronavac
Pfizer	8 semanas após D1	4 meses após D2	Preferencialmente Pfizer, se não disponível, utilizar Coronavac

8. DE 12 A 17 ANOS IMUNOCOMPROMETIDOS, INCLUINDO GESTANTE E PUÉRPERAS IMUNOCOMPROMETIDAS

ESQUEMA PRIMÁRIO		DOSE ADICIONAL (DA)		REFORÇO (REF)	
D1	D2	Intervalo	Imunizante	Intervalo	Imunizante
Pfizer	8 semanas após D1	8 semanas após D2	Pfizer	4 meses após DA	Pfizer